stryker

Sage Oral Care System™

q8°



EN Contents:
- (2) Packages of (1) Untreated Suction Toothbrush, 7 mL Sage Oral Solution, (1) Applicator Swab.
- (1) Package of (1) Untreated Suction Swab, 7 mL Sage Oral Solution, (1) Applicator Swab.

Suction Toothbrush use: Aids in the removal of dental plaque, debris, and oral secretions. **Instructions:** Burst solution packet with thumbs. Peel package open. Attach Suction Toothbrush to suction line. Brush teeth and oral cavity for 1 minute. To suction, place thumb over port. Rinse to clear tubing after use. Discard according to hospital protocol and local regulations. Use Applicator Swab if additional cleansing is needed. **Sage Oral Solution:** Do not rinse with water or other mouthwashes, brush teeth or eat immediately after using Sage Oral Solution. Do not swallow. To minimize discoloration of teeth, brush and floss daily. STORE ABOVE FREEZING (0˚C or 32˚F).

Suction Swab use: Aids in the removal of oral secretions and debris. **Instructions:** Burst solution packet with thumbs. Peel package open. Attach Suction Swab to suction line. Clean mouth for 1 minute. To suction, place thumb over port. Rinse to clear tubing after use. Discard according to hospital protocol and local regulations. Use Applicator Swab if additional cleansing is needed. **Sage Oral Solution:** Do not rinse with water or other mouthwashes, brush teeth or eat immediately after using Sage Oral Solution. Do not swallow. To minimize discoloration of teeth, brush and floss daily. STORE ABOVE FREEZING (0˚C or 32˚F).

⚠ Do not allow patient to bite down on the oral care tool. Use a bite block if patient has altered levels of consciousness or cannot comprehend commands. Use caution with children and unresponsive individuals. Failure to follow these safety precautions may damage the device and present a choking/aspiration hazard. May not function as intended/potential risk of cross-contamination if device is reused.

Not made with natural rubber latex.

The user and/or the patient should report any serious product-related incident to both the manufacturer and the competent authority of the state/country where the user and/or patient is established.

Suction Toothbrush and Suction Swab: MDD 93/42/EEC CE 2797 MD

Applicator Swab: MDR 2017/745 CE MD

Sage Oral Solution: EC Cosmetic Regulation 1223/2009

Ingredients †Sage Oral Solution

DE Inhalt:
- (2) Packungen mit jeweils (1) unbehandelter Absaugzahnbürste, 7 ml Sage Mundspüllösung im Quetschbeutel, (1) Applikationstupfer.
- (1) Packung mit jeweils (1) unbehandelter Absaugtupfer, 7 ml Sage Mundspüllösung im Quetschbeutel und (1) Applikationstupfer.

Verwendung der Absaugzahnbürste: Hilft bei der Entfernung von Zahnbelag, Ablagerungen und oralen Sekreten. **Anleitung:** Vor dem Öffnen der Verpackung die Reinigungslösung im Quetschbeutel in der geschlossenen Verpackung aufdrücken, so dass die Applikationstupfer mit der Flüssigkeit getränkt wird. Entfernen Sie die Verpackung. Zum Ansaugen einfach den Daumen über der Öffnung platzieren. Die Saugleistung regulieren Sie, indem Sie den Daumen auf den Daumenport legen bzw. lösen. Gemäß Krankenhausprotokoll und örtlichen Vorschriften entsorgen. Verwenden Sie den Applikationstupfer, wenn zusätzliche Reinigung benötigt wird. **Sage Mundspülung:** Nicht mit Wasser oder anderen Mundwassern spülen. Zähne unmittelbar nach der Anwendung der Sage Mundspülung nicht putzen und nicht essen. Nicht schlucken. Um Verfärbungen der Zähne zu minimieren, täglich Zahnbürste und Zahnseide benutzen. ÜBER DEM GEFRIERPUNKT (0 °C oder 32 °F) AUFBEWAHREN.

Verwendung des Absaugtupfers: Hilft bei der Entfernung von oralen Sekreten und Verschmutzungen. **Anleitung:** Vor dem Öffnen der Verpackung die Reinigungslösung im Quetschbeutel in der geschlossenen Verpackung aufdrücken, so dass die Absaugzahnbürste mit der Flüssigkeit getränkt wird. Entfernen Sie die Verpackung. Befestigen Sie den Absaugtupfer an der Saugleitung. Reinigen Sie Ihren Mund 1 Minute lang. Zum Ansaugen einfach den Daumen über der Öffnung platzieren. Nach der Verwendung spülen Sie bitte die Rohrleitung aus. Gemäß Krankenhausprotokoll und örtlichen Vorschriften entsorgen. Verwenden Sie den Applikationstupfer, wenn zusätzliche Reinigung benötigt wird. Sage Mundspülung: Nicht mit Wasser oder anderen Mundwassern spülen. Zähne unmittelbar nach der Anwendung der Sage Mundspülung nicht putzen und nicht essen. Nicht schlucken. Um Verfärbungen der Zähne zu minimieren, täglich Zahnbürste und Zahnseide benutzen. ÜBER DEM GEFRIERPUNKT (0 °C oder 32 °F) AUFBEWAHREN.

⚠ Achten Sie darauf, dass die Patienten auf keinen Fall auf das Mundpflegewerkzeug beißen. Bei der oralen Pflege an Patienten mit einem veränderten Bewusstseinszustand oder Personen, die keine Anweisungen verstehen können, einen Beißblock verwenden. Speziell bei Kindern und nicht ansprechbaren Patienten sollten Sie besonders vorsichtig vorgehen. Die Nichtbeachtung dieser Sicherheitsmaßnahmen kann das Gerät beschädigen und eine Erstickungs-/Aspirationsgefahr darstellen. Funktioniert möglicherweise nicht wie vorgesehen/potenzielles Risiko einer Kreuzkontamination bei Wiederverwendung des Geräts.

Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt.

Der Benutzer und/oder Patient sind angehalten, jeglichen schwerwiegenden produktbezogenen Vorfall sowohl dem Hersteller als auch der zuständigen Behörde seines Bundeslandes/Landes zu melden.

Absaugzahnbürste und Absaugtupfer: MDD 93/42/EEC CE 2797 MD

Applikationstupfer: MDR 2017/745 CE MD

Sage Mundspülung: EC Cosmetic Regulation 1223/2009

Ingredients †Sage Mundspülung

FR Contient :
- (2) paquets de (1) brosse à dents d'aspiration non traitée, 7 mL de solution buccale Sage, (1) écouvillon applicateur.
- (1) paquet de (1) écouvillon aspirant non traité, 7 mL de Solution buccale Sage, (1) écouvillon applicateur.

Utilisation de la brosse à dents aspirante : Aide à ôter la plaque dentaire, les résidus et les sécrétions buccales. **Instructions :** Ouvrir le paquet de solution avec les pouces. Le déballer. Fixer la brosse à dents aspirante à la ligne d'aspiration. Brosser les dents et la cavité buccale pendant 1 minute. Pour aspirer, placer le pouce sur le port. Rincer pour nettoyer le tube après son utilisation. Jeter conformément au protocole de l'hôpital et à la réglementation locale. Utiliser l'écouvillon applicateur si un nettoyage complémentaire est nécessaire. **Solution buccale Sage :** Ne pas rincer avec de l'eau ou d'autres bains de bouche, ne pas se brosser les dents ou manger immédiatement après l'utilisation de la solution buccale Sage. Ne pas l'avaler. Pour réduire la décoloration des dents, les brosser et utiliser un fil dentaire tous les jours. GARDER À L'ABRI DU GEL (0 ˚C ou 32 ˚F).

Utilisation l'écouvillon aspirant : Aide à ôter les sécrétions et les résidus buccaux. **Instructions :** Ouvrir le paquet de solution avec les pouces. Le déballer. Fixer l'écouvillon aspirant à la ligne d'aspiration. Nettoyer la bouche pendant 1 minute. Pour aspirer, placer le pouce sur le port. Rincer pour nettoyer le tube après utilisation. Jeter conformément au protocole de l'hôpital et à la réglementation locale. Utiliser l'écouvillon applicateur si un nettoyage complémentaire est nécessaire. **Solution buccale Sage :** Ne pas rincer avec de l'eau ou d'autres bains de bouche, ne pas se brosser les dents ou manger immédiatement après l'utilisation de la solution buccale Sage. Ne pas l'avaler. Pour réduire la décoloration des dents, les brosser et utiliser un fil dentaire tous les jours. GARDER À L'ABRI DU GEL (0 ˚C ou 32 ˚F).

⚠ Ne pas laisser le patient mordre l'outil de soin buccal. Utiliser un bloc de morsure si le patient n'est pas conscient ou ne peut pas comprendre les instructions. Soyez attentif avec les enfants et les individus inconscients. En cas de non-respect de ces précautions de sécurité, l'outil pourrait être endommagé et un risque d'étouffement/aspiration pourrait être présent. Peut ne pas fonctionner car un risque intentionnel/potentiel d'intercontamination existe si l'outil est réutilisé.

Non fabriqué à base de latex en caoutchouc naturel.

L'utilisateur ou le patient doit signaler tout incident grave lié au produit au fabricant et à l'autorité compétente de l'État ou du pays où l'utilisateur ou le patient est établi.

Brosse à dents aspirante et tampon aspirant : MDD 93/42/EEC CE 2797 MD

Écouvillon applicateur : MDR 2017/745 CE MD

Solution buccale Sage et : EC Cosmetic Regulation 1223/2009

Ingredients †Solution buccale Sage

NL Inhoud:
- (2) verpakkingen met (1) onbehandelde afzuigtandenborstel, 7 ml Sage orale oplossing, (1) applicator-staafje.
- (1) verpakking met (1) onbehandelde afzuigstaafje, 7 ml Sage orale oplossing en (1) applicator-staafje.

Gebruik van afzuigtandenborstel: Helpt bij het verwijderen van tandplak, etensrestjes en orale secreties. **Instructies:** Breek verpakking met oplossing open met duimen. Trek pakket open. Bevestig de afzuigtandenborstel aan de afzuigslang. Borstel tanden en mondholte gedurende 1 minuut. Om af te zuigen, plaats de duim over de uitlaatopening. Spoel na gebruik om de slangen schoon te maken. Gooi weg overeenkomstig het protocol van het ziekenhuis en lokale wetgeving. Gebruik reinigingsstaafje als extra reiniging nodig is. **Sage orale oplossing:** Niet spoelen met water of andere mondspoeling, de tanden niet poetsen of niet direct eten na gebruik van Sage orale oplossing. Niet doorslikken. Om de verkleuring van tanden te minimaliseren, dagelijks borstelen en flossen. BEWAREN BOVEN HET VRIESPUNT (0 °C of 32 °F).

Gebruik van afzuigstaafje: Helpt bij het verwijderen van orale secreties en etensrestjes. **Instructies:** Breek verpakking met oplossing open met duimen. Trek pakket open. Bevestig het afzuigstaafje aan de zuigleiding. Maak de mond gedurende 1 minuut schoon. Om af te zuigen, plaats de duim over de uitlaatopening. Spoel na gebruik om slangen schoon te maken. Gooi weg overeenkomstig het protocol van het ziekenhuis en lokale wetgeving. Gebruik reinigingsstaafje als extra reiniging nodig is. **Sage orale oplossing:** Niet spoelen met water of andere mondspoeling, de tanden poetsen of direct eten na gebruik van Sage orale oplossing. Niet doorslikken. Om de verkleuring van tanden te minimaliseren, dagelijks borstelen en flossen. BEWAREN BOVEN HET VRIESPUNT (0 °C of 32 °F).

⚠ Sta niet toe dat de patiënt op het mondverzorgingshulpmiddel bijt. Gebruik een bijtblok als de patiënt een gewijzigd bewustzijnsniveau heeft of geen opdrachten begrijpt. Wees voorzichtig met kinderen en niet-reagerende personen. Het niet opvolgen van deze veiligheidsmaatregelen kan het hulpmiddel beschadigen en een verstikkings-/aspiratiegevaar opleveren. Werkt mogelijk niet zoals bedoeld/potentieel risico van kruisbesmetting als het hulpmiddel opnieuw wordt gebruikt.

Niet gemaakt met natuurlijke rubberlatex.

De gebruiker en/of de patiënt moet elk ernstig incident gerelateerd aan het product melden aan zowel de fabrikant als de bevoegde autoriteit van de staat/land waar de gebruiker en/of patiënt is gevestigd.

Afzuigtandenborstel en afzuigstaafje: MDD 93/42/EEC CE 2797 MD

Applicator-staafje: MDR 2017/745 CE MD

Sage orale oplossing: EC Cosmetic Regulation 1223/2009

Ingredients †Sage orale oplossing

IT Contenuto:
- (2) confezioni di (1) spazzolino con canale di aspirazione non trattato, soluzione orale Sage da 7 ml, (1) tampone applicatore.
- (1) confezione di (1) tampone con canale di aspirazione non trattato, soluzione orale Sage da 7 ml, (1) tampone applicatore.

Utilizzo dello spazzolino con canale di aspirazione: Aiuta nella rimozione di placca dentaria, detriti e secrezioni orali. **Istruzioni:** rilasciare il liquido della bustina effettuando una pressione con i pollici. Aprire la confezione. Collegare lo spazzolino al sistema di aspirazione. Spazzolare i denti e la cavità orale per 1 minuto. Per aspirare posizionare il pollice sulla valvola integrata. Risciacquare per pulire la linea di aspirazione dopo l'uso. Smaltire secondo il protocollo ospedaliero e le normative locali. Utilizzare il tampone applicatore se è necessaria una pulizia aggiuntiva. **Soluzione Orale di Sage:** Non sciacquare con acqua o altri collutori, non lavarsi i denti e non mangiare subito dopo aver usato la soluzione orale di Sage. Non ingerire. Per ridurre al minimo le alterazioni di colore dei denti, usare spazzolino e filo interdentale ogni giorno. CONSERVARE AL DI SOPRA DEL PUNTO DI CONGELAMENTO (0°C o 32°F).

Utilizzo del tampone con canale di aspirazione: Aiuta nella rimozione di secrezioni orali e detriti. **Istruzioni:** rilasciare il liquido della bustina effettuando una pressione con i pollici. Aprire la confezione. Collegare il tampone al sistema di aspirazione. Pulire la cavità orale per 1 minuto. Per aspirare posizionare il pollice sulla valvola integrata. Risciacquare per pulire la linea di aspirazione dopo l'uso. Smaltire secondo il protocollo ospedaliero e le normative locali. Utilizzare il tampone applicatore se è necessaria una pulizia aggiuntiva. **Soluzione orale di Sage:** Non sciacquare con acqua o altri colluttori, non lavarsi i denti e non mangiare subito dopo avere usato la soluzione orale di Sage. Non ingerire. Per ridurre al minimo le alterazioni di colore dei denti, usare spazzolino e filo interdentale ogni giorno. CONSERVARE AL DI SOPRA DEL PUNTO DI CONGELAMENTO (0°C o 32°F).

⚠ Non consentire al paziente di mordere lo strumento per la cura orale. Utilizzare un apribocca nel caso il paziente presenti livelli alterati di coscienza o non possa comprendere i comandi. Fare attenzione in caso di bambini o individui non coscienti. La mancata osservanza di queste precauzioni di sicurezza può danneggiare il dispositivo e determinare un rischio di soffocamento/aspirazione. Potrebbe funzionare in modo inaspettato/vi è un rischio potenziale di contaminazione incrociata, nel caso in cui il dispositivo venga riutilizzato.

Non prodotto con lattice di gomma naturale.

L'utilizzatore e/o il paziente sono tenuti a riferire qualsiasi incidente grave relativo al prodotto sia al fabbricante che all'autorità competente dello stato/paese in cui risiede l'utilizzatore e/o il paziente.

Spazzolino con canale di aspirazione e tampone con canale di aspirazione: MDD 93/42/EEC CE 2797 MD

Tampone applicatore: MDR 2017/745 CE MD

Soluzione orale Sage: EC Cosmetic Regulation 1223/2009

Ingredients †Soluzione orale Sage

PL Zawartość:
- (2) opakowania zawierające (1) naturalną szczoteczkę do zębów z odsysaniem, 7 ml roztworu do ust Sage, (1) gąbkę-aplikator.
- (1) opakowanie zawierające (1) naturalną gąbkę odsysającą, 7 ml roztworu do ust Sage, (1) gąbkę-aplikator.

Zastosowanie szczoteczki do zębów z odsysaniem: pomoc w usuwaniu płytki nazębnej, osadów oraz wydzielin z jamy ustnej. **Instrukcje:** ściśnij palcami pakiet z roztworem. Otwórz opakowanie. Przymocuj szczoteczkę do zębów z odsysaniem do przewodu ssącego. Czyść zęby i jamę ustną przez 1 minutę. Aby odessać, umieść kciuk nad portem. Przepłucz, aby wyczyścić rurki po użyciu. Wyrzuć zgodnie z procedurami obowiązującymi w szpitalu i lokalnymi przepisami. W przypadku gdy konieczne jest dodatkowe czyszczenie, użyj gąbki-aplikatora. **Roztwór do ust Sage:** natychmiast po użyciu roztworu do ust Sage nie należy płukać jamy ustnej wodą ani innymi płynami, myć zębów ani jeść. Nie połykać. Aby zminimalizować ryzyko przebarwienia zębów, należy czyścić zęby i nitkować je codziennie. PRZECHOWYWAĆ W TEMPERATURZE POWYŻEJ ZERA (0˚C lub 32˚F).

Zastosowanie gąbki odsysającej: pomoc w usuwaniu z ust wydzieliny i osadów. **Instrukcje:** ściśnij palcami pakiet z roztworem. Otwórz opakowanie. Przymocuj gąbkę odsysającą do przewodu ssącego. Czyść jamę ustną przez 1 minutę. Aby odessać, umieść kciuk nad portem. Przepłucz, aby wyczyścić rurki po użyciu. Wyrzuć zgodnie z procedurami obowiązującymi w szpitalu i lokalnymi przepisami. W przypadku gdy konieczne jest dodatkowe czyszczenie, użyj gąbki-aplikatora. **Roztwór do ust Sage:** natychmiast po użyciu roztworu do ust Sage nie należy płukać jamy ustnej wodą ani innymi płynami, myć zębów ani jeść. Nie połykać. Aby zminimalizować ryzyko przebarwienia zębów, należy czyścić zęby i nitkować je codziennie. PRZECHOWYWAĆ W TEMPERATURZE POWYŻEJ ZERA (0˚C lub 32˚F).

⚠ Nie dopuść, żeby pacjent przegryzł przyrząd do pielęgnacji jamy ustnej. Jeśli pacjent ma zaburzenia świadomości lub nie rozumie poleceń, zastosuj zabezpieczenie przed przegryzieniem. Zachowaj ostrożność w przypadku dzieci i osób niereagujących. Nieprzestrzeganie tych zaleceń może spowodować uszkodzenie urządzenia i stworzyć niebezpieczeństwo połknięcia go lub zachłyśnięcia. Jeśli urządzenie zostanie ponownie wykorzystane, może nie działać w oczekiwany sposób lub spowodować zakażenie krzyżowe.

Nie zawiera naturalnej gumy lateksowej.

Użytkownik i/lub pacjent powinien zgłosić wszelkie poważne zdarzenia związane z produktem zarówno producentowi, jak i kompetentnym władzom stanu/kraju stanowiącego miejsce pobytu użytkownika i/lub pacjenta.

Szczoteczka do zębów z odsysaniem i gąbka z odsysaniem: MDD 93/42/EEC CE 2797 MD

Gąbka-aplikator: MDR 2017/745 CE MD

Roztwór do ust Sage: EC Cosmetic Regulation 1223/2009

Ingredients †Roztwór do ust Sage

ES Contenido:
- 2 paquetes con 1 cepillo de dientes de succión sin tratar, 7 ml de solución oral Sage, 1 bastoncillo aplicador.
- 1 paquete de 1 bastoncillo de succión sin tratar, 7 ml de solución oral Sage, y 1 bastoncillo aplicador.

Uso del cepillo de dientes de succión: Ayuda a eliminar la placa dental, restos y secreciones bucales. **Instrucciones:** Rompa el paquete contentivo de la solución con los pulgares. Despegue para abrir el paquete. Conecte el cepillo de dientes de succión a la línea de succión. Cepille los dientes y la cavidad bucal durante 1 minuto. Coloque el pulgar sobre el puerto a fin de succionar. Enjuagar para limpiar el tubo tras su uso. Elimine los desechos según el protocolo del hospital y las normativas locales. Use el aplicador si necesita limpieza adicional. **Solución oral Sage:** No enjuagar con agua u otros enjuagues bucales, cepillarse los dientes ni comer inmediatamente después de usar Sage Oral Solution. No lo trague. Para minimizar la decoloración de los dientes, cepille y use hilo dental todos los días. ALMACENAR POR ENCIMA DEL PUNTO DE CONGELACIÓN (0 ° C o 32 ° F).

Uso del bastoncillo de succión: Ayuda a eliminar las secreciones y los restos bucales. **Instrucciones:** Rompa el paquete contentivo de la solución con los pulgares. Despegue para abrir el paquete. Conecte el bastoncillo de succión a la línea de succión. Limpie la boca durante 1 minuto. Coloque el pulgar sobre el puerto a fin de succionar. Enjuagar para limpiar el tubo tras su uso. Elimine los desechos según el protocolo del hospital y las normativas locales. Use el aplicador si necesita limpieza adicional. **Solución oral Sage:** No enjuagar con agua u otros enjuagues bucales, cepillarse los dientes o comer inmediatamente después de usar Sage Oral Solution. No lo trague. Para minimizar la decoloración de los dientes, cepille y use hilo dental todos los días. ALMACENAR POR ENCIMA DEL PUNTO DE CONGELACIÓN (0 ° C o 32 ° F).

⚠ No permita que el paciente muerda la herramienta de cuidado bucal. Utilice un abrebocas si el paciente presenta niveles alterados de consciencia o no comprende las órdenes. Proceda cautelosamente en el caso de niños e individuos en los que no se evidencie respuesta. El incumplimiento de estas precauciones de seguridad puede dañar el dispositivo y presentar un riesgo de asfixia/aspiración. Si el dispositivo es reusado puede afectar al funcionamiento y permitir el riesgo de contaminación cruzada.

Fabricado sin látex de caucho natural.

El usuario y/o el paciente deben informar sobre cualquier incidente grave relacionado con el producto tanto al fabricante como a la autoridad competente del estado/país donde el usuario y/o el paciente estén establecidos.

Cepillo de dientes de succión y bastoncillo de succión: MDD 93/42/EEC CE 2797 MD

Bastoncillo aplicador: MDR 2017/745 CE MD

Solución oral Sage: EC Cosmetic Regulation 1223/2009

Ingredients †Solución oral Sage

PT Conteúdos:
- (2) embalagens de (1) Escova de Dentes de Sucção Não-Tratada, 7 mL Solução Oral Sage, (1) Cotonete Aplicador.
- (1) embalagem de (1) Cotonete de Sucção Não-Tratado, 7 mL de Solução Oral Sage e (1) Cotonete Aplicador.

Utilização da Escova de Dentes de Sucção: ajuda com a remoção da placa dentária, restos de comida e secreções orais. **Instruções:** abra a embalagem com a solução com a ajuda dos polegares. Abra a embalagem. Afixe a Escova de Dentes de Sucção à linha de sucção. Escove os dentes e a cavidade oral durante 1 minuto. Para a sucção, tape o orifício com o polegar. Enxague com água para limpar o duto após a utilização. Descarte de acordo com o protocolo do hospital e os regulamentos locais. Use o Cotonete Aplicador caso seja necessária limpeza adicional. **Solução Oral Sage:** imediatamente após utilizar a Solução Oral Sage, não enxague com água nem outros elixires bucais, não lave os dentes e não coma. Não engula. Para minimizar a descoloração dos dentes, escove-os e use fio dentário diariamente. ARMAZENE ACIMA DA TEMPERATURA DE CONGELAMENTO (0 ˚C ou 32 ˚F).

Utilização do Cotonete de Sucção: auxilia a remoção de secreções orais e restos de comida. **Instruções:** abra a embalagem com a solução com a ajuda dos polegares. Abra a embalagem. Afixe o Cotonete de Sucção à linha de sucção. Limpe a boca durante 1 minuto. Para a sucção, tape o orifício com o polegar. Enxague com água para limpar o duto após a utilização. Descarte de acordo com o protocolo do hospital e os regulamentos locais. Use o Cotonete Aplicador caso seja necessária limpeza adicional. **Solução Oral Sage:** imediatamente após utilizar a Solução Oral Sage, não enxague com água nem outros elixires bucais, não lave os dentes e não comer. Não engula. Para minimizar a descoloração dos dentes, escove-os e use fio dentário diariamente. ARMAZENE ACIMA DA TEMPERATURA DE CONGELAMENTO (0 ˚C ou 32 ˚F).

⚠ Não deixe o paciente morder o instrumento de cuidado oral. Use um abre-boca caso o paciente tenha alterações do estado normal de consciência ou não esteja capaz de compreender as instruções dadas. Tenha cuidado ao usar em crianças e em indivíduos sem capacidade de resposta. O não cumprimento destas regras de segurança poderá danificar o instrumento e poderá criar uma situação de engasgamento/aspiração. A reutilização do instrumento poderá não funcionar conforme previsto ou poderá criar risco de contaminação.

Não contém latex de borracha natural.

O utilizador e/ou o paciente devem comunicar qualquer incidente grave relacionado com o produto ao fabricante e à autoridade competente do estado/país, onde o utilizador e/ou paciente se encontram.

Escova de Dentes de Sucção e Cotonete Aplicador: MDD 93/42/EEC CE 2797 MD

Cotonete Aplicador: MDR 2017/745 CE MD

Solução Oral Sage: EC Cosmetic Regulation 1223/2009

Ingredients †Solução Oral Sage

SV Innehåll:
- (2) paket med (1) obehandlad sugtandborste, 7 ml Sage oral lösning, (1) appliceringssvabb.
- (1) paket med (1) obehandlad sugsvabb, 7 ml Sage oral lösning, (1) appliceringssvabb

Använda sugtandborsten: Hjälper vid borttagning av plack, skräp, och munsekret. **Instruktioner:** Ta sönder lösningspaketet med tummarna. Skala bort paketet. Sätt fast sugtandborsten på sugröret. Borsta tänder och munhåla i 1 minut. För att suga, lägg tummen över öppningen. Skölj för att tömma röret efter användning. Kassera enligt sjukhusets rutiner och lokala bestämmelser. Använd appliceringssvabben om ytterligare rengöring krävs. **Sage oral lösning:** Undvik att skölja med vatten eller andra munvatten, borsta tänderna eller äta omedelbart efter att du använt Sage oral lösning. Svälj inte. För att minimera missfärgning av tänderna, borsta och använd tandtråd dagligen. FÖRVARA ÖVER FRYSTEMPERATUR (0 ˚C eller 32 ˚F).

Använda sugsvabben: Hjälper till att ta bort oralt sekret och skräp. **Instruktioner:** Pressa sönder paketet med lösningen med tummarna. Öppna paketet. Sätt fast sugsvabben på sugröret. Rengör munnen i 1 minut. För att suga, placera tummen över öppningen. Skölj för att rensa röret efter användning. Kassera enligt sjukhusets rutiner och lokala bestämmelser. Använd sugsvabben om ytterligare rengöring krävs. **Sage oral lösning:** Undvik att skölja med vatten eller andra munvatten, borsta tänderna eller äta omedelbart efter att du använt Sage oral lösning. Svälj inte. För att minimera missfärgning av tänderna, borsta och använd tandtråd dagligen. FÖRVARA ÖVER FRYSTEMPERATUR (0 ˚C eller 32 ˚F).

⚠ Tillåt inte patienten att bita i det orala vårdverktyget. Använd ett bitblock om patienten har varierande medvetandenivå eller har svårt att förstå. Gå varsamt tillväga med barn och patienter som inte svarar. Underlåtenhet att följa dessa säkerhetsåtgärder kan skada enheten och medföra risk för kvävning/inandning. Kanske inte fungerar som avsett/risk för korskontaminering när enheten återanvänds.

Ej tillverkad av naturgummilatex.

Användaren och/eller patienten ska rapportera alla allvarliga produktrelaterade incidenter till både tillverkaren och ansvarig myndighet i staten/landet där användaren och/eller patienten är bosatt.

Sugtandborste och sugsvabb: MDD 93/42/EEG CE 2797 MD

Appliceringssvabb: MDR 2017/745 CE MD

Sage oral lösning: Kosmetikförordning (EG) 1223/2009

Ingredients †Sage oral lösning

NO Innhold:
- (2) pakker med (1) Ubehandlet sugetannbørste, 7 ml Sage oral oppløsning, (1) Applikatorpinne.
- (1) pakke med (1) Ubehandlet sugepinne, 7 ml Sage Oral Oppløsning og (1) Applikatorpinne.

Bruk av sugetannbørste: Hjelper med fjerning av dentalt plakk, rester og orale sekresjoner. **Instruksjoner:** Press på oppløsningspakken med tomlene. Åpne pakken. Fest sugetannbørsten til sugeledningen. Børst tennene og munnhulen i 1 minutt. For å suge, plasser tommelen over inngangskoblingen. Skyll for å rense røret etter bruk. Kastes i henhold til sykehusets rutiner og lokale retningslinjer. Bruk applikatorpinnen videre etter behov. **Sage Oral oppløsning:** Ikke skyll med vann eller annet munnvann, og ikke børst tennene eller spis umiddelbart etter bruk av Sage Oral oppløsning. Ikke svelg. For å minimere misfarging av tennene, børst og bruk tanntråd daglig. OPPBEVARES OVER FRYSEPUNKTET (0 ˚C eller 32 ˚F).

Bruk av sugepinne: Hjelper med fjerning av orale sekresjoner og rester. **Instruksjoner:** Press på oppløsningspakken med tomlene. Åpne pakken. Fest sugepinnen til sugeledningen. Rens munnen i 1 minutt. For å suge, plasser tommelen over inngangskoblingen. Skyll for å rense røret etter bruk. Kastes i henhold til sykehusets rutiner og lokale retningslinjer. Bruk applikatorpinnen videre etter behov. **Sage Oral oppløsning:** Ikke skyll med vann eller annet munnvann, og ikke børst tennene eller spis umiddelbart etter bruk av Sage Oral oppløsning. Ikke svelg. For å minimere misfarging av tennene, børst og bruk tanntråd daglig. OPPBEVARES OVER FRYSEPUNKTET (0 ˚C eller 32 ˚F).

⚠ Ikke la pasienten bite på tannhygieneverktøyet. Bruk en biteklosss hvis pasienten har endrede nivåer av bevissthet eller ikke kan forstå kommandoer. Vær forsiktig med barn og individer med manglende respons. Unnlatelse av å følge disse sikkerhetsreglene kan skade enheten og presentere en kvelnings-/aspirasjonsfare fare. Fungerer muligens ikke som tiltenkt/potensiell risiko for krysskontaminering hvis enheten gjenbrukes.

Ikke laget med naturgummilatex.

Brukeren og/eller pasienten skal rapportere enhver alvorlig produktrelatert hendelse til både produsenten og den kompetente myndigheten i staten/landet der brukeren og/eller pasienten er bosatt.

Sugetannbørste og sugepinne: MDD 93/42/EEC CE 2797 MD

Applikatorpinne: MDR 2017/745 CE MD

Sage Oral Oppløsning: EC Cosmetic Regulation 1223/2009

Ingredients †Sage Oral Oppløsning

RO Cuprins:
- (2) pachete de (1) Periuță de dinți cu aspirație netratată, 7 ml Soluție orală Sage, (1) Tampon aplicator.
- (1) pachet cu (1) Tampon de aspirație netratată, 7 ml Soluție orală Sage (1) Tampon aplicator.

Utilizare periuță de dinți cu aspirație: Ajută la îndepărtarea plăcii dentare, a reziduurilor și a secrețiilor orale. **Instrucțiuni:** Rupeți pachetul cu soluție cu degetele mari. Deschideți pachetul. Atașați periuța de dinți cu aspirație la linia de aspirație. Periați dinții și cavitatea bucală timp de 1 minut. Pentru aspirație, așezați degetul mare peste port. După utilizare, clătiți pentru curățarea tubului. A se elimina conform protocolului spitalicesc și reglementărilor locale. Folosiți tamponul aplicator dacă este necesară o spălare suplimentară. **Soluție orală Sage:** Nu clătiți cu apă sau alte ape de gură, nu periați dinții și nu mâncați imediat după folosirea soluției orale Sage. Nu înghițiți. Pentru minimizarea decolorării dinților, periați și folosiți ața dentară zilnic. A SE DEPOZITA PESTE LIMITA DE ÎNGHEȚ (0˚C or 32˚F).

Utilizare tampoane de aspirație: Ajută la îndepărtarea reziduurilor și a secrețiilor orale. **Instrucțiuni:** Rupeți pachetul cu soluție cu degetele mari. Deschideți pachetul. Atașați tamponul de aspirație la linia de aspirație. Curățați gura timp de 1 minut. Pentru aspirație, așezați degetul mare peste port. După utilizare, clătiți pentru curățarea tubului. A se elimina conform protocolului spitalicesc și reglementărilor locale. Aplicați Tamponul aplicator, dacă este necesară o curățare suplimentară

⚠ Nu permiteți pacientului să muște din instrumentul de îngrijire orală. Utilizați un bloc pentru mușcături dacă pacientului i s-a modificat starea de conștiență sau nu poate înțelege comenzile. Acordați atenție copiilor și persoanelor care nu răspund. Nerespectarea acestor măsuri de siguranță poate deteriora dispozitivul și poate prezenta un pericol de sufocare/aspirare. În cazul reutilizării dispozitivului, este posibil ca acesta să nu funcționeze corespunzător/să apară riscul de contaminare încrucișată.

Nu este confecționat din latex din cauciuc natural.

Utilizatorul și/sau pacientul trebuie să raporteze orice incident grav legat de produs atât producătorului, cât și autorității competente din statul/țara în care este stabilit utilizatorul și/sau pacientul.

Periuță de dinți cu aspirație și Tampon de aspirație: MDD 93/42/EEC CE 2797 MD

Tampon aplicator: MDR 2017/745 CE MD

Soluție orală Sage: EC Cosmetic Regulation 1223/2009

Ingredients †Soluție orală Sage

EL Περιεχόμενα:
- (2) πακέτα που περιέχουν (1) Οδοντόβουρτσα Αναρρόφησης Χωρίς Αγωγή, 7 mL Στοματικό Διάλυμα Sage, (1) Μάκτρο Εφαρμογής.
- (1) πακέτο που περιέχει (1) Μάκτρο Αναρρόφησης Χωρίς Αγωγή, 7 mL Στοματικό Διάλυμα, (1) Μάκτρο Εφαρμογής.

Χρήση Οδοντόβουρτσας Αναρρόφησης: Βοηθά στην αφαίρεση οδοντικής πλάκας, υπολειμμάτων και στοματικών εκκρίσεων. **Οδηγίες:** Ανοίξτε το πακέτο διαλύματος με τους αντίχειρες. Ανοίξτε τη συσκευασία. Επικολλήστε την Οδοντόβουρτσα Αναρρόφησης στη γραμμή αναρρόφησης. Βουρτσίστε τα δόντια και τη στοματική κοιλότητα για 1 λεπτό. Για να αναρροφήσετε, τοποθετήστε τον αντίχειρα πάνω από το άνοιγμα. Για να καθαρίσει ο σωλήνας, ξεπλύνετε μετά τη χρήση. Απορρίψτε, σύμφωνα με το νοσοκομειακό πρωτόκολλο και τους τοπικούς κανονισμούς. Χρησιμοποιήστε το Μάκτρο Εφαρμογής αν χρειάζεται επιπρόσθετος καθαρισμός. **Στοματικό Διάλυμα Sage:** Μην ξεπλύνετε με νερό ή άλλα στοματικά διαλύματα, μη βουρτσίσετε τα δόντια ούτε να φάτε αμέσως μετά τη χρήση του Στοματικού Διαλύματος Sage. Μην το καταπίνετε. Για τη μείωση των χρωστικών στα δόντια, βουρτσίστε και κάντε νήμα καθημερινά. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΤΕ ΣΕ ΚΡΥΟ ΜΕΡΟΣ (0˚C ή 32˚F).

Χρήση Μάκτρου Αναρρόφησης: Βοηθά στην απομάκρυνση στοματικών εκκρίσεων και υπολειμμάτων. **Οδηγίες:** Ανοίξτε το πακέτο διαλύματος με τους αντίχειρες. Ανοίξτε τη συσκευασία. Επικολλήστε το Μάκτρο Αναρρόφησης στη γραμμή αναρρόφησης. Καθαρίστε το στόμα για 1 λεπτό. Για να αναρροφήσετε, τοποθετήστε τον αντίχειρα πάνω από το άνοιγμα. Για να καθαρίσει ο σωλήνας, ξεπλύνετε μετά τη χρήση. Απορρίψτε, σύμφωνα με το νοσοκομειακό πρωτόκολλο και τους τοπικούς κανονισμούς. Τοποθετήστε το Ενυδατικό Στόματος στο Μάκτρο Εφαρμογής και εφαρμόστε στα χείλη και στη στοματική κοιλότητα όπως απαιτείται. **Στοματικό Διάλυμα Sage:** Μην ξεπλύνετε με νερό ή άλλα στοματικά διαλύματα, μη βουρτσίσετε τα δόντια ούτε να φάτε αμέσως μετά τη χρήση του Στοματικού Διαλύματος Sage. Μην το καταπίνετε. Για τη μείωση των χρωστικών στα δόντια, βουρτσίστε και κάντε νήμα καθημερινά. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΤΕ ΣΕ ΚΡΥΟ ΜΕΡΟΣ (0˚C ή 32˚F).

⚠ Μην επιτρέπετε στον ασθενή να δαγκώνει το εργαλείο στοματικής φροντίδας. Χρησιμοποιήστε διαστολέα στόματος αν ο ασθενής δεν έχει πλήρεις αισθήσεις ή δεν μπορεί να αντιληφθεί εντολές. Χρησιμοποιήστε με προσοχή σε παιδιά και απαθή άτομα. Η μη εφαρμογή των κανόνων ασφαλείας μπορεί να βλάψει τη συσκευή και να αποτελέσει κίνδυνο πνιξίματος/αναρρόφησης. Ενδεχομένως να μη λειτουργήσει όπως προβλέπεται/πιθανός κίνδυνος επιμόλυνσης σε περίπτωση επαναχρησιμοποίησης της συσκευής.

Δεν αποτελείται από φυσικό λάτεξ καουτσούκ.

Ο χρήστης ή/και ο ασθενής θα πρέπει να αναφέρουν οποιοδήποτε σοβαρό πρόβλημα που σχετίζεται με το προϊόν, τόσο στον κατασκευαστή όσο και στην αρμόδια αρχή του κράτους όπου διαμένει ο χρήστης ή/και ο ασθενής.

Οδοντόβουρτσα Αναρρόφησης και Μάκτρο Αναρρόφησης: MDD 93/42/EEC CE 2797 MD

Μάκτρο Εφαρμογής: MDR 2017/745 CE MD

Στοματικό Διάλυμα Sage: EC Cosmetic Regulation 1223/2009

Ingredients †Στοματικό Διάλυμα Sage

HR Sadržaj:
- (2) pakiranja (1) neobrađena usisna četkica za zube, Sage oralna otopina od 7 ml, (1) tampon za nanošenje.
- (1) pakiranje (1) neobrađeni usisni tampon, Sage oralna otopina od 7 ml, (1) tampon za nanošenje.

Uporaba usisne četkice za zube: Pomaže u uklanjanju zubnog plaka, ostataka i oralne sekrecije. **Upute:** Otvorite pakiranje otopine palcima. Izvucite iz pakiranja. Pričvrstite usisnu četkicu za zube na usisni vod. Četkajte zube i oralnu šupljinu 1 minutu. Za usisavanje, postavite palac preko priključka. Isperite cjevčice nakon uporabe. Bacite u skladu s bolničkim protokolom i lokalnim propisima. Upotrijebite tampon za nanošenje ukoliko je potrebno dodatno čišćenje. **Sage oralna otopina:** Nemojte ispirati vodom niti drugim tekućinama za ispiranje usta, četkati zube ili jesti odmah nakon uporabe Sage oralne otopine. Nemojte progutati. Da biste smanjili obojanost zubi, četkajte i čistite koncem svakodnevno. ČUVAJTE IZNAD TEMPERATURE ZAMRZAVANJA (0˚C ili 32˚F).

Uporaba usisnog tampona: Pomaže u uklanjanju oralne sekrecije i ostataka. **Upute:** Otvorite pakiranje otopine palcima. Izvucite iz pakiranja. Pričvrstite usisni tampon na usisni vod. Čistite usta 1 minutu. Za usisavanje, stavite palac na priključak. Isperite cjevčicu nakon uporabe. Bacite u skladu s bolničkim protokolom i lokalnim propisima. Upotrijebite tampon za nanošenje ukoliko je potrebno dodatno čišćenje. **Sage oralna otopina:** Nemojte ispirati vodom niti drugim tekućinama za ispiranje usta, četkati zube ili jesti odmah nakon uporabe Sage oralne otopine. Nemojte progutati. Da biste smanjili obojanost zubi, četkajte i čistite koncem svakodnevno. ČUVAJTE IZNAD TEMPERATURE ZAMRZAVANJA (0˚C ili 32˚F).

⚠ Nemojte dopustiti pacijentu da ugrize pomagalo za oralnu njegu. Upotrijebite blok za ugriz ako je pacijent promijenio razinu svijesti ili ne može razumjeti naredbe. Budite oprezni s djecom i osobama koje ne reagiraju. Nepoštivanje ovih sigurnosnih mjera može oštetiti uređaj i predstavljati opasnost od gušenja/udisanja. Možda neće funkcionirati kako je planirano/potencijalni rizik od unakrsne kontaminacije ako se uređaj ponovno koristi.

Nije napravljeno s prirodnim gumenim lateksom.

Korisnik i/ili pacijent trebaju prijaviti svaku ozbiljnu nezgodu u vezi s proizvodom proizvođaču te nadležnom tijelu države/zemlje u kojoj se korisnik i/ili pacijent nalaze.

Usisna četkica za zube i usisni tampon: MDD 93/42/EEC CE 2797 MD

Tampon za nanošenje: MDR 2017/745 CE MD

Sage oralna otopina: EC Cosmetic Regulation 1223/2009

Ingredients †Sage oralna otopina

SL Vsebina:
- (2) paketa z (1) neobdelano sesalno zobno ščetko, 7 ml ustne raztopine Sage in (1) paličica za nanos.
- (1) paket z (1) neobdelano sesalno paličico, 7 ml ustne raztopine Sage in (1) paličica za nanos.

Uporaba sesalne zobne ščetke: Pomaga pri odstranjevanju zobnih oblog, ostankov in ustnih izločkov. **Navodila:** Paket z raztopino predrite s palcema. Paket odprite. Sesalno zobno ščetko pritrdite na sesalno cevje. Zobe in ustno votlino ščetkajte 1 minuto. Za sesanje morate čez vhod postaviti svoj palec. Cevje po uporabi izplaknite, da ga očistite. Zavrzite skladno s protokolom bolnišnice in lokalnimi predpisi. Če je potrebno dodatno čiščenje, uporabite paličico za nanos. **Ustna raztopina Sage:** Takoj po uporabi ustne raztopine Sage ust ne smete izpirati z vodo ali drugimi ustnimi vodicami, ne smete ščetkati zob in ne smete jesti. Ne pogoltnite. Za čim manjše obarvanje zob zobe umivajte in čistite z zobno nitko vsakodnevno. SHRANJUJTE PRI TEMPERATURI NAD LEDIŠČEM (0 ˚C ali 32 ˚F).

Uporaba sesalne paličice: Pomaga pri odstranjevanju ustnih izločkov in ostankov. **Navodila:** Paket z raztopino predrite s palcema. Paket odprite. Sesalno paličico pritrdite na sesalno cevje. Usta čistite 1 minuto. Za sesanje morate čez vhod postaviti svoj palec. Cevje po uporabi izplaknite, da ga očistite. Zavrzite skladno s protokolom bolnišnice in lokalnimi predpisi. Če je potrebno dodatno čiščenje, uporabite paličico za nanos. **Ustna raztopina Sage:** Takoj po uporabi ustne raztopine Sage ust ne smete izpirati z vodo ali drugimi ustnimi vodicami, ne smete ščetkati zob in ne smete jesti. Ne pogoltnite. Za čim manjše obarvanje zob zobe umivajte in čistite z zobno nitko vsakodnevno. SHRANJUJTE PRI TEMPERATURI NAD LEDIŠČEM (0 ˚C ali 32 ˚F).

⚠ Preprečite, da bi bolnik ugriznil v pripomoček za ustno higieno. Če je bolnik v spremenjenem stanju zavesti ali ne more razumeti ukazov, uporabite blok proti grizenju. Pri otrocih in neodzivnih odraslih bodite previdni. Če teh varnostnih previdnostnih ukrepov ne upoštevate, lahko povzročite poškodbe pripomočka in nevarnost zadušitve/aspiracije. Pri ponovni uporabi pripomoček morda ne bo pravilno deloval/je možnost tveganja navzkrižne okužbe.

Ni izdelano iz lateksa iz naravnega kavčuka.

Uporabnik in/ali bolnik morata proizvajalcu in pristojnim organom v svoji državi prijaviti vse resne dogodke, povezane z izdelkom.

Sesalna zobna ščetka in sesalna paličica: MDD 93/42/EEC CE 2797 MD

Nanašalna paličica: MDR 2017/745 CE MD

Ustna raztopina Sage: EC Cosmetic Regulation 1223/2009

Ingredients †Ustna raztopina Sage

DA Indhold:
- (2) pakker med (1) ubehandlet sugetandbørste, 7 ml Sage Oral opløsning, (1) applikatorpind.
- (1) pakke med (1) sugeswab, 7 ml Sage Oral opløsning, (1) applikatorpind.

Brug af sugetandbørste: Hjælper med fjernelse af tandbelægninger, henfalden væv og orale sekretioner. **Vejledning:** Bryd opløsningspakken med tommelfingrene. Pil pakken åben. Forbind sugetandbørsten til sugeslangen. Børst tænderne og mundhulen i 1 minut. For at suge anbringes tommelfingeren over åbningen. Skyl for at rense røret efter brug. Bortskaffes i henhold til hospitalets procedure og de lokale bestemmelser. Brug applikatorswab hvis der er behov for yderligere rensning. **Sage Oral opløsning:** Du bør ikke skylle efter med vand eller andre mundskyllemidler, børste tænder eller spise mad lige efter at have anvendt Sage Oral opløsning. Må ikke synkes. For at mindske misfarvning af tænderne, skal man børste og flosse dagligt. OPBEVARES OVER FRYSEPUNKTET (0 ˚C eller 32 ˚F).

Sugeswabbrug: Hjælper med fjernelsen af mundsekretioner og henfalden væv. **Vejledning:** Bryd opløsningspakken med tommelfingrene. Pil pakken åben. Sæt sugeswab til sugeslange. Rengør munden i 1 minut. For at suge anbringes tommelfingeren over åbningen. Skyl for at rense røret efter brug. Bortskaffes i henhold til hospitalets procedure og de lokale bestemmelser. Brug applikatorswab hvis der er behov for yderligere rensning. **Sage Oral opløsning:** Du bør ikke skylle efter med vand eller andre mundskyllemidler, børste tænder eller spise mad lige efter at have anvendt Sage Oral opløsning. Må ikke synkes. For at mindske misfarvning af tænderne, skal man børste og flosse dagligt. OPBEVARES OVER FRYSEPUNKTET (0 C eller 32 F).

⚠ Patienten må ikke bide i det orale tandværktøj. Brug en bidepude, hvis patienten har ændret bevidsthedsgrad eller ikke kan forstå anvisninger. Udvis forsigtighed med børn og ikke-responderende personer. Hvis disse sikkerhedsforholdsregler ikke følges, kan anordningen blive beskadiget og udgøre en kvælnings-/aspirationsrisiko. Fungerer måske ikke efter hensigten/ potentiel risiko for krydskontamination hvis anordningen genbruges.

Ikke fremstille med naturlig gummilatex.

Brugeren og/eller patienten skal indberette enhver alvorlig produktrelateret hændelse til både producenten og den kompetente myndighed i den stat eller det land, hvor brugeren og/eller patienten befinder sig.

Sugetandbørste og sugeswab: MDD 93/42/EEC CE 2797 MD

Applikatorswab: MDR 2017/745 CE MD

Sage Oral opløsning: EC Cosmetic Regulation 1223/2009

Ingredients †Sage oral opløsning

Ingredients: Ingredients, Bestandteile, Ingrédients, Ingrediënten, Composizione, Zawartość, Ingredientes, Ingredientes, Ingredienser, Ingredienser, Ingrediente, Συστατικά, Sastojci, Sestavine, Indhold:
†water (aqua), alcohol, glycerin, PEG-40 sorbitan diisostearate, flavor (aroma), chlorhexidine digluconate, sodium saccharin, Blue 1 (CI 42090)

UDI: Unique Device Identifier, Medizinprodukt, Identifiant unique des dispositifs, Unique Device Identifier, Identificativo unico del dispositivo, Niepowtarzalny identyfikator wyrobu, Identificador de dispositivo único, Identificador de Dispositivo Exclusivo, Unik identitetsbeteckning, Unik utstyrsidentifikasjon, Identificator Dispozitiv Unic, Μοναδικό αναγνωριστικό συσκευής, Jedinstvena identifikacija proizvoda, Edinstveni identifikator pripomočka, Unik enhedsidentifikator

MD: Medical Device, Medizinprodukt, Dispositif médical, Medisch hulpmiddel, Dispositivo medico, Wyrób medyczny, Dispositivo médico, Dispositivo Médico, Medicinteknisk produkt, Medisinsk utstyr, Dispozitiv medical, Ιατροτεχνολογικό προϊόν, Medicinski proizvod, Medicinski pripomoček, Medicinteknisk utrustning

RP: Responsible Person, Verantwortliche(r), Responsable, Verantwoordelijke persoon, Persona Responsabile, Osoba odpowiedzialna, El responsable, Pessoa responsável, Ansvarlig person, Ansvarlig person, Persoană responsabilă, Υπεύθυνο άτομο, Odgovorna osoba, Odgovorna oseba, Ansvarlig person

U.S. Patents: U.S. Patents, US-Patente, Brevets américains, VS-octrooien, Brevetti statunitensi, Patenty w USA, Patentes estadounidenses, Patentes E.U.A., U.S. Patent, Amerikanske patenter, Brevete S.U.A., Πατέντες Η.Π.Α., Patenti u S.A.D., Patenti ZDA, Patenter i USA: stryker.com/patents

Sage Products LLC
3909 Three Oaks Road • Cary, IL 60013 U.S.A.
+1 815 455 4700 • stryker.com
Made in U.S.A.

EC REP / RP: MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover, Germany

REF 6908–X

6 18029 83124 8

R4809 042020